



Hygienekonzept

Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C

Sprachtherapie MUNDt
Logopädische Gemeinschaftspraxis

J.Graf-Wegner & B.Brandt
Bürgerheimstr. 4, 10365 Berlin
☎ 030-57795988

Hygienekonzept

Ziel und Zweck dieses Hygieneplans ist, Infektionen (Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C) zu vorzubeugen und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Die nachfolgend festgelegten Maßnahmen sollen Patienten und alle in und außerhalb der Praxis Beteiligten vor Infektionen und anderen Gesundheitsschäden bewahren.

Alle Mitarbeiter sind geschult und in die Inhalte des Hygienekonzepts unterwiesen.



Hygienekonzept

Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C

Sprachtherapie MUNDt
Logopädische Gemeinschaftspraxis

J.Graf-Wegner & B.Brandt
Bürgerheimstr. 4, 10365 Berlin
☎ 030-57795988

Innerhalb der Praxis				
Was	Wann	Womit	Wie	Wer
Händewaschen	bei Arbeitsbeginn nach/vor jedem Patientenwechsel bei sichtbarer Verunreinigung nach Toilettenbenutzung nach Arbeitsende	Waschlotion	Hände nass machen, Waschlotion aus dem Spender entnehmen. Waschlotion in der gesamten Handfläche unter Einschluss der Fingerkuppen und der Fingerzwischenräume einreiben, unter fließendem Wasser waschen. Danach mit Einmalhandtuch gründlich trocknen.	Therapeut Mitarbeiter Patient
hygienische Händedesinfektion	vor und nach jedem Patientenkontakt nach Kontakt mit unmittelbaren Patientenkontakflächen	Hände- desinfektionsmittel mindestens: begrenzt viruzid	Händedesinfektionsmittel in die trockenen Hände einreiben. Eine ausreichende Menge Desinfektionsmittel verwenden. Die ganze Hand soll benetzt sein. Einreibzeit beträgt mindestens 30 Sekunden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Einreibung von Fingerkuppen, Nagelfalz und Daumen.	Therapeut Mitarbeiter Patient



Hygienekonzept

Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C

Sprachtherapie MUNDt
Logopädische Gemeinschaftspraxis

J.Graf-Wegner & B.Brandt
Bürgerheimstr. 4, 10365 Berlin
☎ 030-57795988

Was	Wann	Womit	Wie	Wer
Mund-Nasenschutz (MNS)	immer bei Kontakt	Mund-Nasenschutzmaske	Mund und Nase müssen dicht bedeckt sein Anlegen mit frisch desinfizierten Händen bei wahrscheinlicher Kontamination MNS erneuern (P. hustest, niest etc.)	Therapeut Mitarbeiter Patient
Einmalhandschuhe	bei allen Therapien, in denen Körperkontakt mit dem Patienten erforderlich ist	medizinische Schutzhandschuhe unsteril. (Einmalhandschuhe)	siehe Merkblatt in Anlage „Schutzhandschuhe richtig ausziehen“ vom RKI	Therapeut
Reinigung von Arbeits- und Kontaktflächen (Klinken, Tisch, Lichtschalter, Tastaturen, Therapiegegenstände/ -material, Sanitärflächen)	nach jeder Therapie und am Arbeitende werden alle Arbeitsflächen und Kontaktflächen desinfiziert.	Flächendesinfektionsmittel mindestens: begrenzt viruzid	Vliestücher (gebrauchsfertige, mit Desinfektionsmittelgetränkte) Tücher aus der Spenderbox entnehmen. Fläche durch Wischen desinfizieren (Wisch-Desinfektion). <i>oder</i> gebrauchsfertige Lösung aus der Flasche auf die Fläche aufbringen. Anschließend das Präparat mit einem Tuch gleichmäßig verteilen.	Therapeut Mitarbeiter
Belüftung	Therapieraum: nach jeder Therapie Wartebereich: stündlich zum Arbeitende gesamte Praxis		Fenster weit öffnen mindestens 5 Minuten	Therapeut Mitarbeiter

Patienten, Therapeuten und Mitarbeiter mit Anzeichen von Grippeähnlichen Symptomen werden gebeten, telefonisch vereinbarte Termine abzusagen.

Um Mindestabstände im Wartebereich zu realisieren, dürfen Patienten jeweils nur von einer Person begleitet werden.

Zeitschriften, Spielzeug und Getränke werden im Wartebereich nicht mehr angeboten. Begrüßung erfolgt ohne Körperkontakt.



Hygienekonzept

Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C

Sprachtherapie MUNDt
Logopädische Gemeinschaftspraxis

J.Graf-Wegner & B.Brandt
Bürgerheimstr. 4, 10365 Berlin
☎ 030-57795988

Außerhalb der Praxis (Hausbesuche, Pflegeheime, Wohngemeinschaften etc.)				
Was	Wann	Womit	Wie	Wer
Händewaschen	bei Arbeitsbeginn nach/vor jedem Patientenwechsel bei sichtbarer Verunreinigung nach Toilettenbenutzung am Arbeitsende	Waschlotion	Hände nass machen, Waschlotion aus dem Spender entnehmen. Waschlotion in der gesamten Handfläche unter Einschluss der Fingerkuppen und der Fingerzwischenräume einreiben, unter fließendem Wasser waschen. Danach mit Einmalhandtuch gründlich trocknen.	Therapeut Mitarbeiter Patient
hygienische Händedesinfektion	vor und nach Betreten der Einrichtung	Händedesinfektionsmittel führt jeder Therapeut immer bei sich. mindestens: begrenzt viruzid	Händedesinfektionsmittel in die trockenen Hände einreiben. Eine ausreichende Menge Desinfektionsmittel verwenden. Die ganze Hand soll benetzt sein. Einreibzeit beträgt mindestens 30 Sekunden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Einreibung von Fingerkuppen, Nagelfalz und Daumen.	Therapeut Mitarbeiter Patient
Mund-Nasenschutz (MNS)	immer bei Kontakt	Mund-Nasenschutzmaske	Mund und Nase müssen dicht bedeckt sein. Anlegen mit frisch desinfizierten Händen. Bei wahrscheinlicher Kontamination MNS erneuern (P. hustest, niest etc.)	Therapeut Mitarbeiter Patient



Hygienekonzept

Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C

Sprachtherapie MUNDt
Logopädische Gemeinschaftspraxis

J.Graf-Wegner & B.Brandt
Bürgerheimstr. 4, 10365 Berlin
☎ 030-57795988

Was	Wann	Womit	Wie	Wer
Einmalhandschuhe	bei allen Therapien, in denen Körperkontakt mit dem Patienten erforderlich ist	medizinische Schutzhandschuhe unsteril Einmalhandschuhe	siehe Merkblatt in Anlage „Schutzhandschuhe richtig ausziehen“ vom RKI	Therapeut
Schutzkittel/Schutzkleidung	Behandlung bei Patienten mit bekannten Keimen als Prävention bei Patienten, die neu eingezogen sind für Zeitraum der ersten 14 Tage zusätzlich FFP2-Maske	Schutzkittel/-kleidung	fachgerecht an- und ablegen unter Vermeidung von Umgebungskontamination ablegen vor und nach Ablegen Händedesinfektion durchführen	Therapeut
Reinigung von Arbeits-/ Kontaktflächen (Tisch, Tastaturen, Therapiegegenstände/ -materialien)	nach jeder Therapie werden alle Arbeitsflächen desinfiziert.	Flächendesinfektionsmittel mindestens: begrenzt viruzid	Vliestücher (gebrauchsfertige, mit Desinfektionsmittel getränkte) Tücher aus der Spenderbox entnehmen. Fläche durch Wischen desinfizieren (Wisch-Desinfektion). <i>oder</i> gebrauchsfertige Lösung aus der Flasche auf die Fläche aufbringen. Anschließend das Präparat mit einem Tuch gleichmäßig verteilen und ohne Nachwischen einwirken lassen.	Therapeut

Anlagen
„Schutzhandschuhe sicher ausziehen“ (Quelle. Robert Koch Institut)

Quellen:
www.kvbw-admin.de
www.hygiene-medizinprodukte.de



Hygienekonzept

Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C

Sprachtherapie MUNDt
Logopädische Gemeinschaftspraxis

J.Graf-Wegner & B.Brandt
Bürgerheimstr. 4, 10365 Berlin
☎ 030-57795988

Hygienekonzept

Ziel und Zweck dieses Hygieneplans ist, Infektionen (Schwerpunktmäßig SARS-CoV-2C) zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Die nachfolgend festgelegten Maßnahmen sollen Patienten und alle in und außerhalb der Praxis Beteiligten vor Infektionen und anderen Gesundheitsschäden bewahren.

Alle Mitarbeiter sind geschult und in die Inhalte des Hygienekonzepts unterwiesen.

Datum	Unterschrift Mitarbeiter